

एच.आई.भी. र एड्स भनेको के हो ?

मानिसमा रोग सँग लड्न सक्ने क्षमतामा ह्रास गराउने जीवाणुको नाम एच.आई.भी. हो । यी जीवाणुहरू मानिसको शरिर भित्र प्रवेश गरेपछि संक्रमित व्यक्तिको प्रतिरक्षा शक्ति क्रमशः कमजोर भएर विभिन्न रोगका लक्षणहरू देखा पर्ने अवस्था नै एड्स हो ।

एच. आई.भी. कसरी सर्छ ?

१. असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्दा ।



२. एच.आई.भी. संक्रमित रगत, शारीरिक अङ्ग वा प्रत्यारोपण गर्दा ।



३. अरुले प्रयोग गरेको सुई, सिरिन्ज तथा ब्लेड साटासाट गरी प्रयोग गर्दा ।



४. संक्रमित आमाबाट बच्चा जन्मने बेलामा र आमाको दुधबाट बच्चालाई एच.आई.भी. सर्न सक्छ ।



के के गर्दा एच. आई. भी. सडैन ?

१. एच.आई.भी. तथा एड्स भएका व्यक्तिको हेरविचार गर्दा ।



२. एच.आई.भी. भएको व्यक्तिले प्रयोग गरेको चर्पी, धारा, कुवा र पानीको प्रयोग गर्दा ।



३. एच.आई.भी. भएको व्यक्तिले प्रयोग गरेको लुगाफाटो, काँड्यो, भाँडाकुँडा प्रयोग गर्दा अनि एउटै भाँडामा खाना खाँदा ।



४. कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा ।



५. एच.आई.भी. भएको व्यक्तिको पसिना, थुक, पिसाव, आँसु, वान्ता आदिको सम्पर्कमा आउँदा सडैन ।



६. एच.आई.भी. भएको व्यक्तिलाई छुँदा, अङ्गालौं हाल्दा वा सड्गै बस्दा सडैन ।



एच.आई.भी. बाट बच्न के के व्यवहारहरू अपनाउनुपर्छ ?

१. प्रत्येक पटकको यौन सम्पर्कमा कण्डम सही तरिकाले प्रयोग गर्ने ।



२. सुइ तथा सिरिन्ज प्रयोग गर्दा सधैं नयाँ वा निर्मलीकरण गरेको मात्र प्रयोग गर्ने ।

३. रगत लिँदा वा दिँदा एच.आई.भी. संक्रमण नभएको सुनिश्चित गर्ने ।

४. प्रत्येक गर्भवती महिलाले एच.आई.भी. जाँच गराई आफ्नो नवजात शिशुलाई एच.आई.भी. लाग्नबाट जोगाउने ।

५. होस गुमाउने गरी मादक पदार्थको सेवन गर्दा निर्णय गर्ने क्षमतामा कमी ल्याई जोखिमपूर्ण क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुने सम्भावनालाई बढाउने हुनाले यस्तो पदार्थहरूको सेवन गरेर यौन सम्पर्क नराख्ने ।




एच.आई.भी. भएमा के गर्ने ?

एच.आई.भी. भनेको जीवनको अन्त्य हैन। एच.आई.भी. संक्रमण भएमा नजिकैका अस्पतालमा सम्पर्क राखी उचित उपचार लिई संक्रमित व्यक्तिको सकारात्मक व्यवहार, उचित खानपान, स्वास्थ्य एवं हेरविचार, परिवार र समुदायको सहयोग लिई धेरै वर्ष सम्म स्वस्थ रहन सक्छन् ।

"A world without stigma & discrimination"

एच.आई.भी. र एड्स
पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यौनजन्य संक्रमण



शान्ति फाउण्डेशन

कुमारीगाल, बौद्ध, वार्ड नं. ६, काठमाडौं, नेपाल

Contact: +97701-5107548

Website: www.shantifoundations.org.np

Email ID: shantifoundations@gmail.com



AMERICA NEPAL
MEDICAL
FOUNDATION
Advancing Healthcare in Nepal

पाठेघरको मुखको क्यान्सर

पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलाहरूमा हुने संसारमै दोस्रो सबैभन्दा प्रमुख क्यान्सर हो । महिलाहरूमा हुने क्यान्सर मध्ये यो एउटा मात्र क्यान्सर हो जुन अगावै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरको संकेत र लक्षणहरू:


१. महिनावारीको बिच बिचमा तथा महिनावारी सुकिसकेपछि महिलाहरूमा रगत देखिनु ।
 २. यौन सम्पर्क पछि रगत देखा पर्नु ।
 ३. यौनीबाट गन्हाउने पानी बग्नु ।
- पछिल्लो चरणमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका लक्षणहरूमा भोक कम लाग्नु, तौल घट्नु, थकाइ लाग्नु, श्रोणि (तल्लो पेट), ढाड दुख्नु, खुट्टादुख्नु, खुट्टा सुन्निनु, अत्याधिक योनि श्राव हुनु, र (विरलै) योनिबाट दिशा पिसाब भएको थाहा नहुनु ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुनुका कारणहरू:

१. Human papilloma Virus (जिबाणुको संक्रमण)
२. विभिन्न हर्मोनहरू कारण
३. वशाणुगत
४. धूम्रपान
५. खाने गर्भ निरोधक चककी
६. धेरै चोटि गर्भवती हुनु

कसले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच वा परिक्षण गर्नु पर्छ ?

१. ३० बर्षभन्दा माथिका महिलाहरूले स्त्रीनिंग टेस्ट गर्नु पर्छ ।
२. ३० बर्ष भन्दा कम उमेरका महिलालाई यो परीक्षणहरू गर्नुपर्दैन किनकि यस उमेर सम्हमा यो क्यान्सर कमै देखिन्छ ।
३. गर्भवती महिलाहरूले स्त्रीनिंग परीक्षण गर्नुहुदैन ।
४. गर्भवती महिलाहरूले बच्चा जन्माएको ६ हप्ता सम्म कुनै पर्दछ त्यसपछि परीक्षणको लागि जान सक्नुहुन्छ ।



स्त्रीनिंग टेस्ट वा जाँचमा जानु भन्दा पहिले महिलाहरूले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्छ:

१. महिनावारी भएको समयमा स्त्रीनिंगमा नजाने
२. परीक्षणको कम्तिमा २४ घण्टा अघि योनीलाई कुनै किसिमको दबाव नदिए
३. परीक्षणको कम्तिमा २४ घण्टा अघि यौन सम्पर्क नगर्ने
४. परीक्षणको कम्तिमा २४ घण्टा अघि कुनै पनि किसिमको क्रीम वा जेल प्रयोग नगर्ने

यौन जन्य संक्रमित संक्रमण

यौन रोग मुख्यतया एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यौन सम्पर्कको माध्यमबाट प्रसारित हुने संक्रमण हो । यसको सामाजिक प्रभाव र एच.आई.भी. र एड्स सँगको सम्बन्ध रहेको छ ।

यौन रोग सँगै माध्यमहरू

१. यौन सम्पर्क: एक संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यौन सम्पर्क द्वारा मुख्य (मलद्वार, योनी वा मौखिक) लाग्दछ ।
२. आमाबाट बच्चा: गर्भावस्था र बच्चा जन्माउँदा सर्दछ ।
३. कहिले काँही दूषित औंलाहरू, रगतका उत्पादनहरूको माध्यमबाट सर्दछ ।
४. अंग प्रत्यारोपण द्वारा, दूषित सुई र सामग्री जन्य (जस्तै साभना तौलिया र यौन खेलौनाहरू), निर्मुलिकरण नगरि प्रयोग गर्दा सर्दछ ।

यौन रोगको संकेत र लक्षणहरू:

मुख्यतया महिलाहरूमा:

१. असामान्य योनि श्राव ।
२. पिशाब गर्दा पोल्ने, सामान्य भन्दा धेरै पिशाब लाग्ने
३. तल्लो पेट दुख्ने ।
४. पेरिनियम, मलद्वार र मलाशय, मुखवरिपरि र कहिले काँही अन्य स्थानहरूको भित्र वा वरपर दुख्ने, चिलाउने, खटिरा, स-साना दानाहरू देखिने, अल्सर वा मांसपेशी वृद्धि हुने ।
५. काखी, योनी र मलद्वार र मलाशय वरपर सुनिनु ।

महिलाहरूमा यौन रोगका जटिलताहरू:

१. श्रोणि वा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग (Pelvic Inflammatory Disease)
२. पाठेघरको मुखको क्यान्सर र मलाशयको क्यान्सर (Cervical and Anal Cancer)
३. एक्टोपिक गर्भावस्था (Ectopic pregnancy)
४. गर्भपतन वा मृत अवस्थामा बच्चा जन्मिनु । (Abortion, Still Birth)

यौन रोगबाट बाच्ने उपायहरू:

१. एक जना भन्दा बढि सँग यौन सम्पर्क नराख्ने ।
२. यौन सम्पर्क गर्दा कन्डमको प्रयोग गर्ने ।
३. जोखिमपूर्ण वा असुरक्षित यौन अभ्यासहरू नगर्ने ।
४. खोप लगाउने - हेपेटाइटिस बी र एचपीभीको लागी खोपहरू उपलब्ध छन् ।
५. रुमाल वा भित्री वस्त्रहरू एक अर्का सँगै साटेर नलगाउने ।
६. संभोगको अघि र पछाडि यौन अंग राम्रो सँगै धुनु होस् ।



श्रोत: :NCASC र WHO

